WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales anmeldung veröffentlicht nach dem vertrag über die Internationale zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5: WO 93/18746 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: A1 (43) Internationales A61K 9/00 30. September 1993 (30.09.93) Veröffentlichungsdatum: PCT/EP93/00496 (21) Internationales Aktenzeichen: (22) Internationales Anmeldedatum: 4. März 1993 (04.03.93) (30) Prioritätsdaten: SN, TD, TG). P 42 08 505.5 17. März 1992 (17.03.92) DE 8. Mai 1992 (08.05.92) P 42 15 188.0 DE 16. September 1992 (16.09.92) DE Veröffentlicht P 42 30 876.3 Mit internationalem Recherchenbericht. (71) Anmelder: ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Weismülserstrasse 45, D-6000 Frankfurt (Main) 1 (DE). (72) Erfinder: HETTCHE, Helmut; Martinstrasse 23, D-6057 Dietzenbach (DE). ENGEL, Jürgen; Erlenweg 3, D-8755 Alzenau (DE). MUCKENSCHNABEL, Reinhard; Am Weissen Turm 33, D-6000 Frankfurt (Main) 60 (54) Title: PRESSURIZED GAS PACKAGINGS USING POLYOXYETHYLENE GLYCERYL-OBATES (54) Bezeichnung: DRUCKGASPACKUNGEN UNTER VERWENDUNG VON POLYOXYETHYLEN-GLYCERYL **OLEATEN** (57) Abstract Described are aerosol pressurized gas packagings with new suspension stabilizers. (57) Zusammenfassung Es werden Aerosol-Druckgaspackungen mit neuen Suspensionsstabilisatoren beschrieben.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfhögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich			MR	Mauritanien
ÜA	Australien	FR	Frankreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GA	Gabon	NL	Niederlande
BE	Belgien	CB	Vereinigtes Königreich	NO	Norwegen
BF	Burkina Faso	GN	Guinca	NZ	Neusecland
BG	Bulgarien	GR	Griechenland	PL	Polen
BJ	Benin	HU	Ungarn	PT	Portugal
BR	Brasilien	ΙE	Irland	RO	Rumänien
CA	Kanada	IT	Italien	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	JP	Japan	SD	Sudan
CC	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SK	Slowakischen Republik
CI	Côte d'Ivoire	ΚZ	Kasachstan	SN	Senegal
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	รบ	Soviet Union
cs	Tschechoslowakei	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CZ	Tschechischen Republik	ւՄ	Luxemburg	TG	Togo
DĒ	Deutschland	MC	Monaco	UA	Ukraine
DK	Dänemark	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
ES	Spanien	MI.	Mali	VN	Vietnam
FI	Finnland	MN	Mongolci		

1

Druckgaspackungen unter Verwendung von Polyoxyethylen-glyceryl-oleaten

Beschreibung

Aerosol-Druckgaspackungen werden seit vielen Jahren für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet. Unter Aerosol-Druckgaspackungen versteht man druckfeste Behältnissse, aus denen eine unter Druck stehende Mischung aus verflüssigtem Treibgas und Wirkstoff durch Betätigung eines Ventils freigesetzt wird. Druckgaspackungen sind beispielsweise in Sucker, Fuchs und Speiser (Herausgeber), Pharmazeutische Technologie, Thieme, Stuttgart, 1991, S. 673 - 688 beschrieben, weiter werden Aerosole und Druckgaspackungen in List, Arzneiformenlehre, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1985, S. 8 - 18 und in Voigt, Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie, VCh, Weinheim, 1987 auf den Seiten 427 - 436 beschrieben. Weiter wird diese populare Darreichungsform von Thoma, Aerosole, Selbstverlag, Frankfurt am Main, 1979 ausführlich erläutert. Im medizinischen Bereich werden sie vorteilhaft dann eingesetzt, wenn Wirkstoffe direkt in die Lunge transportiert und dort deponiert werden sollen. Der Vorteil der Aerosol-Druckgaspackungen besteht darin, daß bei ihrer Verwendung eine Wolke feinstzerteilter Partikel entsteht, die vom Patienten eingeatmet werden kann. In der Folge kommt es zu einem raschen Wirkungseintritt am Wirkort Lunge, was für die Therapie beispielsweise des Asthma bronchiale von entscheidender Wichtigkeit ist. Auf der anderen Seite kann bei der Prävention von Asthmaanfällen durch prophylaktisch wirksame Substanzen bei derartig lokaler Applikation direkt in die Lunge die Dosierung niedrig gehalten werden. Damit ist das Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen minimiert im Vergleich zur Applikation über den Magen/Darm-Trakt.

Aerosol-Druckgaspackungen haben daher eine weite
Verbreitung in der Therapie von Atemwegserkrankungen
gefunden. Sie sind einfach, sicher und preiswert.
Mögliche Probleme bei der Koordination von Atemzug des
Patienten und Auslösung eines Aerosolstoßes können
entweder durch zwischen Aerosolpackung und Mund des
Patienten eingeschobene Expansionskammern ("Spacer")
oder durch spezielle Konstruktionen der Inhalatoren
vermieden werden, bei denen der Einatemzug des
Patienten den Aerosolstoß auslöst.
Neben der inhalativen Anwendung zur Prophylaxe von
Asthma bronchiale und zur Therapie des akuten
Asthmaanfalls kann die erfindungsgemäße Formulierung
auch als Nasenspray und zur Anwendung als Mundspray
(linguale und bukkale Applikation) gelangen.

Als Treibmittel für Dosieraerosole setzte man bisher FCKW ein (fluorierte chlorierte Kohlenwasserstoffe). Verwendbar als Treibmittel sind zum Beispiel folgende fluorierte chlorierte Kohlenwasserstoffe und Kohlenwasserstoffe: Pentan, n-Butan, iso-Butan, TG 11, TG 12, TG 21, TG 22, TG 23, TG 113, TG 114, TG 115, TG 142b und TG C 318. Die Typenbezeichnung der fluorierten Chlorkohlenwaserstoffe leitet sich aus folgendem Schlüsselsystem ab:

Zahl in Einerstelle = Anzahl Fluoratome
(F)

Zahl in Zehnerstelle minus 1 = Anzahl Wasserstoffatome (H)

Zahl in Hunderterstelle plus 1 = Anzahl Kohlenstoffatome (C)

Zahl der noch freien Valenzen = Anzahl Chloratome

Seit Aufstellung der Ozontheorie (Abbau des stratosphärischen Ozons durch FCKW und andere chlorhaltige organische Verbindungen) sucht man als Treibmittel geeignete Flüssiggase, die weder brennbar, noch in der Lage sind, Ozon abzubauen und außerdem nicht gesundheitsschädlich sind.

(C1)

Seit einiger Zeit arbeitet man mit nichtchlorierten Fluorkohlenwasserstoffen wie beispielsweise 1,1,1,2-Tetrafluorethan (TG 134a) oder 2H-Heptafluorpropan (TG 227).

Außer TG 134a und TG 227 wäre noch TG 152a (Difluorethan, $\mathrm{CH_3CFF_2}$), TG 143a (Trifluorethan, $\mathrm{CH_3CF_3}$) und TG 161 (Fluorethan, $\mathrm{CH_3CH_2F}$) zu nennen.

Nachteilig an diesen Treibmitteln ist allerdings, daß zu ihrer Verwendung erforderliche Suspensionsstabilisatoren und Ventilschmiermittel nicht in ausreichendem Maße in ihnen löslich sind. So erfordert die Verwendung von TG 134a etwa 25 % Ethanol, um das bisher in Aerosolsuspensionen verwendete Sorbitantrioleat (Span®85).in ausreichendem Maße zu lösen (s. EP 372 777 Å 2). Beispielsweise können noch folgende Verbindungen verwendet werden: mehrwertige Alkohole wie zum Beispiel Glycerol, Ester wie zum Beispiel Ethylacetat, Ketone wie zum Beispiel Aceton und Kohlenwasserstoffe wie zum Beispiel Hexan und Heptan, Pentan und auch Isopropanol. Nachteilig bei einer derartig hohen Konzentration ist, daß es zu Auflösungserscheinungen für den in der Suspension befindlichen Wirkstoff kommen kann und damit die Gefahr des Teilchenwachstums besteht. Wachsen beim Lagern einer derartigen Suspension die Wirkstoffteilchen über eine Größe von 10 μm, so kann es einerseits zu Verstopfungen des Aerosolventils, auf der anderen Seite aber zu einer Wirkungsverringerung bis zu Unwirksamkeit des Aerosols kommen, da die Wirkstoffpartikel aufgrund ihrer Größe nicht mehr in der Lage sind, tiefere Lungenabschnitte zu erreichen.

Es besteht also ein dringender Bedarf nach Substanzen, die

- physiologisch verträglich sind
- technologisch geeignet sind,
 Aerosolsuspensionen von TG 134a oder TG 227 zu stabilisieren sowie die Funktion des Dosierventils zu verbessern
- in TG 134a oder TG 227 ohne oder unter Anwendung geringster Mengen anderer physiologisch verträglicher Lösungsvermittler löslich sind
- geschmacklich akzeptabel sind.

Es wurde nun überraschend gefunden, daß

Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat eine Substanz mit
den eben erwähnten erforderlichen Eigenschaften
darstellt (Handelsname "Tagat® TO"; Hersteller:
Goldschmidt, Essen)

Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat hat folgende

Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat hat folgende Strukturformel:

wobei gilt: $x+y+z \approx 20 - 30$

Der HLB-Wert beträgt 11,3; die Hydroxylzahl liegt zwischen 18 und 33; die Säurezahl erreicht höchstens 2; die Verseifungszahl liegt zwischen 75 und 90 und die Jodzahl zwischen 34 und 40.

Die Hydroxylzahl wurde nach DGF-C-V 17a, die Säurezahl nach DGF-C-V 2, die Verseifungszahl nach DGF-C-V 3 und die Jodzahl nach DGF-C-V 11 bestimmt. Polyoxylethylen-25-glyceryl-trioleat ist eine bernsteinfarbige Flüssigkeit.

Polyoxyethylen-glyceryl-trioleat ist

- physiologisch verträglich (vergleichbar mit Sorbitantrioleat (= $Span^{\oplus}85$)
- technologisch geeignet, Aerosolsuspension von
 TG 134a und/oder TG 227 zu stabilisieren sowie
 die Funktion des Dosierventils zu verbessern.
- in TG 134a bzw. TG 227 löslich unter gleichzeitiger Anwesenheit von weniger als 1-2 % Ethanol oder vergleichbarer Alkohole
- geschmacklich akzeptabel

Weitere, als Suspensionsstabilisatoren geeignete Verbindungen, die die vorstehend erwähnten Eigenschaften aufweisen sind:

Tagat®0
 Tagat®0 1st chemisch ein
 Polyoxyethylen-30-glyceryl-monooleat.

Polyoxyethylen-30-glyceryl-monooleat hat folgende Strukturformel:

wobei n: ca. 30.

Der HLB-Wert beträgt 16.4; die Hydroxylzahl liegt zwischen 50 und 65; die Säurezahl erreicht höchstens 2; die Verseifungszahl liegt zwischen 30 und 45 und die Jodzahl zwischen 15 und 19.

Tagat®02
 Tagat®02 ist chemisch ein
 Polyoxyethylen-20-glyceryl-monooleat.

Polyoxyethylen-20-glyceryl-monooleat hat folgende Strukturformel

m: ca. 20.

Der HLB-Wert beträgt 15.0; die Hydroxylzahl liegt zwischen 70 und 85; die Säurezahl erreicht höchstens 2; die Verseifungszahl liegt zwischen 40 und 55 und die Jödzahl zwischen 21 und 27.

Das Lösungsvermögen einer Mischung von TG 134a oder TG 227 mit 1-2 % Ethanol für die üblichen Wirksubstanzen ist derartig gering, daß es keine Rolle für ein mögliches Kristallwachstum der Wirkstoffe spielt. Die bisher in Handelspräparaten eingesetzten Suspensionsstabilisatoren hatten einen HLB-Wert von unter 5 (z.B. Span 85: HLB = 1.8) und liegen damit im Bereich der W/O-Emulgatoren. (Voigt, Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie, Weinheim, 1987, S. 332) Es ist daher überraschend, daß eine Substanz wie Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat, Polyoxyethylen-30-glyceryl-monooleat und Polyoxyethylen-20-glyceryl-monooleat mit einem . HLB-Wert von 11.3 bis 16.4 für diesen Zweck geeignet ist.

Die eingesetzte Menge an

Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat,

Polyoxyethylen-30-glyceryl-monooleat und

Polyoxyehtylen-20-glyceryl-monooleat bezogen auf eine
eingesetzte Menge Wirkstoff beträgt beispielsweise
zwischen 0,3 und 8000, insbesondere 5 und 4000 und
besonders bevorzugt zwischen 15 und 2500 Gewichts %.

Als Wirkstoffe können eingesetzt werden:

Analgetika, Antiallergika, Antibiotika, Anticholinergika, Antihistaminika, antiinflammatorisch wirkende Substanzen, Antitussiva, Bronchodilatatoren, Diuretika, Enzyme, Herz-Kreislauf wirksame Substanzen, Hormone, Proteine und Peptide. Beispiele für Anal-. getika sind Codein, Diamorphin, Dihydromorphin, Ergotamin, Fentanyl, Morphin; Beispiele für Antiallergika sind Cromo-glicinsäure, Nedocromil; Beispiele für Antibiotika sind Cephalosporine, Fusafungin, Neomycin, Penicilline, Pentamidin, Streptomycin, Sulfonamide, Tetracycline; Beispiele für Anticholinergika sind Atropin, Atropinmethonitrat, Ipratropiumbromid, Oxitropiumbromid, Trospiumchlorid; Beispiele für Antihistaminika sind Azelastin, Flezelastin, Methapyrilen; Beispiele für antiinflammatorisch wirksame Substanzen sind Beclomethason, Budesonid, Dexamethason, Flunisolid, Fluticason, Tipredane, Triamcinolon; Beispiele für Antitussiva sind Narcotin, Noscapin; Beispiele für Bronchodilatatoren sind Bambuterol, Bitolterol, Carbuterol, Clembuterol, Ephedrin, Epinephrin, Formoterol, Fenoterol, Hexoprenalin, Ibuterol, Isoprenalin, Isoproterenol, Metaproterenol, Orciprenalin, Phenylephrin, Phenylpropanolamin, Pirbuterol, Procaterol, Reproterol, Rimiterol, Salbutamol, Salmeterol, Sulfonterol, Terbutalin, Tolobuterol; Beispiele für Diuretika sind Amilorid, Furosemid; ein Beispiel für Enzyme ist Trypsin; Beispiele für Herz-Kreislauf wirksame Substanzen sind Diltiazem und Nitraglycerin; Beispiele für Hormone sind Cortison, Hydrocortison, Prednisolon; Beispiele für Proteine und Peptide sind Cyclosporine, Cetrorelix, Glucagon, Insulin. Weitere Wirkstoffe, die eingesetzt werden können, sind Adrenochrom, Colchicin, Heparin, Scopolamin.

Es können auch Kombinationen der vorstehend aufgeführten Substanzen eingesetzt werden.

Die beispielhaft angeführten Wirkstoffe können als freie Basen oder Säuren oder als pharmazeutisch verträgliche Salze eingesetzt werden. Als Gegenionen können beispielsweise physiologisch verträgliche . Erdalkali- oder Alkalimetalle oer Amine sowie beispielsweise Azetat, Benzolsulfonat, Benzoat, Hydrogencarbonat, Hydrogentartrat, Bromid, Chlorid, Iodid, Karbonat, Citrat, Fumarat, Malat, Maleat, Gluconat, Lactat, Pamonat, Hydroxynaphtoat und Sulphat eingesetzt werden. Es können auch Ester eingesetzt werden, zum Beispiel Acetat, Acetonid, Propionat, Dipropionat, Valerat. Die Menge an Tagat(R)TO, Tagat(R)O oder Tagat(R)O2, bezogen auf die Gesamtmischung, zusammengesetzt aus Wirkstoffen, Treibgas oder Teibgasgemischen, gegebenenfalls Hilfsstoffen, beträgt beispielsweise 0,01 Gew.% - 5 Gew.%, insbesondere 0,2 Gew. % - 2,5 Gew. % und besonders bevorzugt

Der Zusatz von Cosolventien ist möglich,
beispielsweise aliphatische Alkohole mit 2 bis 6
C-Atomen oder deren Ester oder Ketone oder Polygole.
Beispiele sind Ethanol, Isopropanol, Proylenglykol,
Aceton, Essigsäurethylester, n-Propanol, vorzugsweise
Ethanol und Isopropanol.

0,75 Gew. \$ - 1,5 Gew. \$.

Die Menge an Ethanol oder Isopropanol, bezogen auf die Gesamtmischung, beträgt zwischen O Gew. bis 10 Gew. insbesondere 0,1 Gew. bis 2 Gew. und besonders bevorzugt 0,2 Gew. bis 1 Gew. 2.

Der Zusatz weiterer grenzflächenaktiver Substanzen, wie beispielsweise in EP 0 372 777 aufgeführt, ist selbstverständlich möglich.

Die Suspendierung der Wirkstoffe kann entweder erfolgen bei normalem Luftdruck, wobei das Suspensionsmedium auf niedrige Temperaturen abgekühlt werden muß (zum Beispiel – 35°C bis – 55°C) oder innerhalb eines Druckgefäßes, wobei bei Normaltemperaturen (Raumtemperatur 15° bis 25°C) gearbeitet werden kann.

Die Suspension wird homogenisiert und anschließend in Druckdosen abgefüllt, die mit einem Dosierventil verschlossen sind oder anschließend verschlossen werden.

Beispiel 1

1000 g 2H-Heptafluorpropan (= Treibmittel 227) werden auf eine Temperatur von etwa -55°C abgekühlt und unter Rühren mit einer Lösung aus aus 11,7 g Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat (Handelsname: Tagat® TO, Goldschmidt AG) in 11,7 g absolutem Ethanol versetzt. Anschließend werden 16,8 g mikronisierte Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz und 8,4 g mikronisiertes Reproterolhydrochlorid sowie 0,9 g mikronisiertes Saccharin-Natrium und 6,75 g Pfefferminzöl zugesetzt und die entstandene Suspension intensiv homogenisiert. Unter weiterem Rühren und Kühlen wird die Suspension mit gekühltem Treibmittel 227 auf 1170,0 g aufgefüllt und sodann in Metalldosen abgefüllt, die mit Dosierventilen verschlossen werden, welche pro Hub 50 μl der Suspension freisetzen. Pro Hub werden damit 1 mg Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz und 0,5 mg Reproterolhydrochlorid freigesetzt.

Beispiel 2

1000 g 2H-Heptafluorpropan (= Treibmittel 227) werden auf eine Temperatur von etwa -55°C abgekühlt und unter Rühren mit einer Lösung aus aus 11,7 g Polyoxyethylen-30-glyceryl-monooleat (Handelsname: Tagat® O, Goldschmidt AG) in 11,7 g absolutem Ethanol versetzt. Anschließend werden 16,8 g mikronisierte Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz und 8,4 g

mikronisiertes Reproterolhydrochlorid sowie 0,9 g mikronisiertes Saccharin-Natrium und 6,75 g Pfefferminzöl zugesetzt und die entstandene Suspension intensiv homogenisiert. Unter weiterem Rühren und Kühlen wird die Suspension mit gekühltem Treibmittel 227 auf 1170,0 g aufgefüllt und sodann in Metalldosen abgefüllt, die mit Dosierventilen verschlossen werden, welche pro Hub 50 μ l der Suspension freisetzen. Pro Hub werden damit 1 mg Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz und 0,5 mg Reproterolhydrochlorid freigesetzt.

Beispiel 3

1000 g 2H-Heptafluorpropan (= Treibmittel 227) werden auf eine Temperatur von etwa -55°C abgekühlt und unter Rühren mit einer Lösung aus aus 11,7 g Polyoxyethylen-20-glyceryl-monooleat (Handelsname: Tagat® 02, Goldschmidt AG) in 11,7 g absolutem Ethanol versetzt. Anschließend werden 16,8 g mikronisierte Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz und 8,4 g mikronisiertes Reproterolhydrochlorid sowie 0,9 g mikronisiertes Saccharin-Natrium und 6,75 g Pfefferminzöl zugesetzt und die entstandene Suspension intensiv homogenisiert. Unter weiterem Rühren und Kühlen wird die Suspension mit gekühltem Treibmittel 227 auf 1170.0 g aufgefüllt und sodann in Metalldosen abgefüllt, die mit Dosierventilen verschlossen werden, welche pro Hub 50 μl der Suspension freisetzen. Pro Hub werden damit 1 mg Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz und 0,5 mg Reproterolhydrochlorid freigesetzt.

Beispiel 4

Es wird gearbeitet wie in Beispiel 1, jedoch wird statt 16,8 g mikronisierter Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz und 8,4 g mikronisiertem Reproterolhydrochlorid 16,8 g mikronisiertes D-18024 eingesetzt.

Pro Hub werden damit 1 mg D-18024 freigesetzt. D-18024 hat folgende Strukturformel:

D-18024 trägt den INN Flezelastinhydrochlorid.

Beispiel 5

Es wird gearbeitet wie in Beispiel 1, jedoch wird statt 16,8 g mikronisiertem Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz, 8,4 g mikronisiertem Reproterolhydrochlorid, 0,9 g mikronisiertem Saccharin-Natrium und 6,75 g Pefferminzöl 4,2 g mikronisiertes Budesonid eingesetzt. Ein Hub enthält 0,25 mg Budesonid.

Beispiel 6

1000 g Heptafluorpropan (=Treibmittel 227) werden auf eine Temperatur von etwa -55° C abgekühlt und unter Rühren mit einer Mischung aus 11,7 g Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat (Handelsname: Tagat (R) TO, Goldschmidt AG) und 6,75 g Dentomint PH 799 959 (Hersteller: Haarmann und Reimer, Holzminden) versetzt. Unter weiterem Rühren und Kühlen werden 16,8 g mikronisierte Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz und 8,4 g mikronisiertes Reproterolhydrochlorid sowie 0,9 g mikronisiertes Saccharin-Natrium zugesetzt und die entstehende Suspension intensiv homogenisiert. Unter weiterem Rühren und Kühlen wird die Suspension mit gekühltem Treibmittel 227 auf 1170,0 g aufgefüllt und sodann in Metalldosen abgefüllt, die mit Dosierventilen verschlossen werden, welche pro Hub 50 μ l der Suspension freisetzen. Pro Hub werden damit 1 mg Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz und 0,5 mg Reproterolhydrochlorid freigesetzt.

Patentansprüche

- Aerosol-Druckgaspackungen zur Verabreichung von biologisch aktiven Substanzen, dadurch gekennzeichnet, daß Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat gemäß Formel I als Suspensionsstabilisator und/oder Ventilschmiermittel verwendet wird.
- Aerosol-Druckgaspackungen zur Verabreichung von biologisch aktiven Substanzen, dadurch gekennzeichnet, daß Polyoxyethylen-30-glyceryl-monooleat gemäß Formel II als Suspensionsstabilisator und/oder Ventilschmiermittel verwendet wird.
- 3. Aerosol-Druckgaspackungen zur Verabreichung von biologisch aktiven Substanzen, dadurch gekennzeichnet, daß Polyoxyethylen-20-glyceryl-monooleat gemäß Formel III als Suspensionsstabilisator und/oder Ventilschmiermittel verwendet wird.
- 4. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat-Anteil gemäß Formel I, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung zwischen 0,01 und 5 Gewichts% liegt.

- 5. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat-Anteil gemäß Formel I, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, zwischen 0,2 und 2,5 Gewichts% liegt.
- 6. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyoxyethylen-25-glyceryl-trioleat-Anteil gemäß Formel I, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, zwischen 0,75 und 1,5 Gewichts% beträgt.
- 7. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyoxyethylen-30-glyceryl-monooleat-Anteil gemäß Formel II, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung zwischen 0,01 und 5 Gewichts% liegt.
- 8. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyoxyethylen-30-glyceryl-monooleat-Anteil gemäß Formel II, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung zwischen 0,2 und 2,5 Gewichts% liegt.
- 9. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyoxyethylen-30-glyceryl-monooleat-Anteil gemäß Formel II, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung zwischen 0,75 und 1,5 Gewichts% liegt.

- 10. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyoxyethylen-20-glyceryl-monooleat-Anteil gemäß Formel III, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, zwischen 0,01 und 5 Gewichts% liegt.
- 11. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyoxyethylen-20-glyceryl-monooleat-Anteil gemäß Formel III, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, zwischen 0,2 und 2,5 Gewichts* liegt.
- 12. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyoxyethylen-20-glyceryl-monooleat-Anteil gemäß Formel III, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, zwischen 0,75 und 1,5 Gewichts% liegt.

- 13. Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß als Treibmittel TG 227 und/oder TG 134a yerwendet wird.
 - 14. Verfahren zur Herstellung von Aerosol-Druckgaspackungen gemäß Anspruch 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß als Treibmittel TG 227 und/oder TG 134a verwendet wird.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/EP 93/00496

A. CLA	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
Int.	Cl. 5 A61K9/00		
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC	
	DS SEARCHED		
1	ocumentation searched (classification system followed by $CL. 5 A61K$	classification symbols)	·
Inc.	AUIR		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the e	xtent that such documents are included in the	he fields searched
			_ •
Elemenia de	ata base consulted during the international search (name o	of data hace and where practicable cearch	terms used)
Electronic da	are pase constities onting the interpational search (name of	of data base and, where practicable, scaren	coms used)
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		1
Category*	Citation of document, with indication, where ap	opropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO,A,8 705 210 (BURGHART 1	KURT)	1-12
	11 September 1987 see claim 1		
Y	WO,A,8 705 211 (BURGHART, 11 September 1987	KURT)	1-12
İ	see claim 1		
Y	EP,A,0 203 211 (CHEMISCH	ADVIESBUREAU)	1,4-6
	3 December 1986	,	-,- ,
	see claim 1 see page 2, line 1 - 1	ine 29	
	see example 1		
Y	JOURNAL DE PHARMACIE DE B	et CTOILE	2,3,7-12
, 1	Vol. 28, No. 2, 1973, BRU		2,3,7 12
Ì	pages 209 - 216		
	I. DONTCHEVA, ET AL. 'étue l'effet stabilisant des s		
	tension-actives sur des s	ystèmes dispersés	
	hétérogènes', see the who	le document	
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
	categories of cited documents:	"I" later document published after the inte date and not in conflict with the appli	
to be of	nt defining the general state of the art which is not considered particular relevance	the principle or theory underlying the	e invention
"L" docume	document but published on or after the international filing date int which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alor	dered to involve an inventive
cited to special	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the	e claimed invention cannot be
"O" docume means	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive combined with one or more other such being obvious to a person skilled in t	documents, such combination
	ent published prior to the international filing date but later than crity date claimed	"&" document member of the same paten	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
3 May	7 1993 (03.05.93)	21 May 1993 (21.0	5.93)
	nailing address of the ISA/	Authorized officer	
Europ	pean Patent Office		
Facsimile N	lo.	Telephone No.	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

EP 9300496 SA 71302

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report.

The members are as contained in the European Patent Office EDP file on
The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

03/05/9

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
WO-A-8705210	11-09-87	AU-B- 601176	06-09-90	
#O X 0/03210	22 00 0.	AU-A- 7127887	28-09-87	
		EP-A,B 0259383	16-03-88	
		JP-T- 63503303	02-12-88	
		US-A- 4863720	05-09-89	
 WO-A-8705211	11-09-87	AU-B- 597049	24-05-90	
40-V-0103511	11 03 0,	AU-A- 7127987	28-09-87	
		CA-A- 1293929	07-01-92	
		DE-A- 3775960	27-02-92	
		EP-A,B 0240484	07-10-87	
		JP-T- 63503304	02-12-88	
			26-09-89	
			31-08-87	
		ZA-A- 8701721	31-00-0/	
EP-A-0203211	03-12 - 86	JP-A- 61293918	24-12-86	
		US-A- 5032408	16-07-91	

FORM PO

For more details about this annex : see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82

Internationales Aktenzeichen

L KLASSIFI	KATION DES ANM	ELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren	Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) ⁶	
Nach der Int	ternationalen Patentk	lassifikation (IPC) oder nach der nationalen I		
Int.Kl.	5 A61K9/00			
n. RECHER	CHIERTE SACHGE	BIETE		
		Recherchierter Mi	indestprüfstoff ⁷	
Klassifikatio	onssytem	K	lassifikationssymbole	
Int.K7.	5	A61K		·
		Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff ge unter die recherchierter	hörende Veröffentlichungen, soweit diese a Sachgebiete fallen ⁸	
	ILAGIGE VEROFFE	NTLICHUNGEN 9 Veröffentlichung 11, soweit erforderlich unte	- Anmhe der massochlichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr.13
Art°	Kennzeichnung der	Veröffentlichung , soweit erroruerien unte	L Villane det mankenmen	
Y	11. Sep	705 210 (BURGHART KURT) tember 1987 nspruch 1		1-12
Y	WO,A,8 11. Sep	705 211 (BURGHART, KURT) tember 1987 nspruch 1)	1-12
Υ	3. Deze siehe A siehe S	203 211 (CHEMISCH ADVIES mber 1986 nspruch 1 eite 2, Zeile 1 - Zeile deispiel 1		1,4-6
"A" Ver defit defit tion "L" Ver I ver fent nam and "O" Ver eine bez TP" Ver tur lich	röffentlichung, die der finiert, aber nicht als i eres Dokument, das je malen Anmeldedatum röffentlichung, die geeifelhaft erscheinen zu tilchungsdatum einer unten Veröffentlichung deren besonderen Grun eröffentlichung, die siche Benutzung, eine Auzieht zu der dem beaucht worden ist HEEINIGUNG	ngegebenen Veröffentlichungen 10: n aligemeinen Stand der Technik besonders bedeutsam anzusehen ist beloch erst am oder nach dem interna- veröffentlicht worden ist ilassen, oder durch die das Veröf- anderen im Recherchenbericht ge- gelegt werden soil oder die aus einem nd angegeben ist (wie ausgeführt) ch auf eine mündliche Offenbarung, isstellung oder andere Maßnahmen r dem internationalen Anmeldeda- nspruchten Prioritätsdatum veröffent-	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem is meldedatum oder dem Prioritätsdatum we ist und mit der Anmeldung nicht kollidie Verständnis des der Erfindung zugrundel oder der ihr zugrundeliegenden Theorie a "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeuts te Erfindung kann nicht als neu oder auf keit beruhend betrachtet werden. "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeuts te Erfindung kann nicht als auf erfinderi ruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlic gorie in Verbindung gebracht wird und die einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	n, soneen un minicipanden Prinzipa ngegeben lit ng; die beanspruch- erfinderischer Tätig- ng; die beanspruch- scher Tätigkeit be- ffentlichung mit hungen dieser Kato- ese Verbindung für Patentfamilie ist
Datum des /	Abschlusses der inter	aationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Reches	chenberichts
ļ	03.	.MAI 1993	21.0	
Internations	ale Recherchenbehörd	e	Unterschrift des bevollmächtigten Bedlen	
1	EUROP	AISCHES PATENTAMT	VENTURA AMAT A.	

IL EINSCHI	SCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)				
Art °	Kennzeichaung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.			
	JOURNAL DE PHARMACIE DE BELGIQUE Bd. 28, Nr. 2, 1973, BRUXELLES (BE)	2,3,7-12			
	Seiten 209 – 216 I. DONTCHEVA, ET AL. 'etude comparee de l'effet stabilisant des substances tensio-actives sur des systemes disperses heterogenes'	,			
	siehe das ganze Dokument				
	•				

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

EP 9300496 SA 71302

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

03/05/93

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO-A-8705210	11-09-87	AU-B- AU-A- EP-A,B JP-T- US-A-	601176 7127887 0259383 63503303 4863720	06-09-90 28-09-87 16-03-88 02-12-88 05-09-89	
WO-A-8705211	11-09-87	AU-B- AU-A- CA-A- DE-A- EP-A,B JP-T- US-A- ZA-A-	597049 7127987 1293929 3775960 0240484 63503304 4869899 8701721	24-05-90 28-09-87 07-01-92 27-02-92 07-10-87 02-12-88 26-09-89 31-08-87	
EP-A-0203211	03-12-86	JP-A- US-A-	61293918 5032408	24-12 - 86 16-07 - 91	